Protezione derrate



K-Obiol® EC 25

Insetticida a lunga durata di protezione

Caratteristiche

Insetticida per la disinfestazione dei cereali immagazzinati e per trattamenti preventivi degli ambienti di stoccaggio. Può essere utilizzato anche in campo per il trattamento della granella all'interno della coclea di raccolta. Agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti dannosi che infestano le derrate immagazzinate. Non trasmette alcun odore sulle derrate trattate e non altera la germinabilità dei semi. K-Obiol® EC 25 assicura una protezione di 6 mesi.

Composizione

Deltametrina pura 2,66% (25 g/L)
Piperonil Butossido 23,96% (225 g/L)

PZ/cartone

FLACONE 1 L × 12 pz

Dosi e modalità d'uso

Applicazione diretta sulle derrate immagazzinate
Impiegare il prodotto alla dose di 10 ml di prodotto/tonnellata. Diluire 1 litro in 100 litri d'acqua e distribuire uniformemente 1 litro della dispersione ottenuta per ogni tonnellata di cereale (ad eccezione del riso), all'atto dell'immagazzinamento, mediante attrezzatura idonea per irrorazione su nastro trasportatore, coclea, elevatore. Per ottenere i migliori risultati è indispensabile una distribuzione uniforme. Prima di introdurre le derrate si consiglia di effettuare un'accurata pulizia e disinfestazione di silos o altri locali di immagazzinamento. Il prodotto deve essere distribuito solo in strutture dotate di idonee attrezzature a basso volume, che nebulizzano il prodotto sulla derrata all'atto dell'immagazzinamento alla base dell'elevatore.
Trattamento diretto ai sacchi di cereali e agli edifici di stoccaggio (magazzini, silos, ecc.)
Diluire 1 litro in 100 litri d'acqua e irrorare, mediante pompa a pressione, 1 litro della dispersione ottenuta ogni 20 m² di superficie da disinfestare.
Trattamento a strati durante il processo di stoccaggio
Trattamento superficiale di strati successivi di granella dello spessore dai 10 ai 30 cm. Diluire 10 ml in 1 litro d'acqua per irrorare, mediante pompa a pressione, 1 tonnellata di derrata da disinfestare.
Trattamento all'interno della coclea durante la raccolta in campo
Trattamento della granella all'interno della coclea di raccolta durante il trasferimento della granella dalla mietitrebbia al carro raccolta. Diluire 10 ml in 1 litro d'acqua per irrorare 1 tonnellata di derrate da disinfestare.

Simbologia di pericolo: GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09 Prodotto Fitosanitario - Reg. N. 6557 del 07/11/1985

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 5 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.