Insetticidi e acaricidi



Impact Gel Formiche

Matrice alimentare altamente appetibile

Caratteristiche

L'esca ha un'eccellente palatabilità e grazie al suo effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall'ingestione, consente alle formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui della colonia. Il prodotto contiene un amaricante (Denatonio benzoato).

Composizione

Imidacloprid puro: 0,01%

PZ/cartone

- 4 SIRINGHE 35 g × 14 pz
- STANTUFFI × 15 pz
- CONTENITORE PER ESCA MINI BIANCO × 50 pz

Dosi e modalità d'uso

Applicare il gel posizionandolo in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nei pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche. Utilizzare 0,2 g/m², corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza. Dopo 7 giorni dall'applicazione, ispezionare e ricollocare l'esca se consumata. Il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente.

Simbologia di pericolo: GHS09 Aut. Biocida: IT/2017/00442/MRP

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 4 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.