Insetticidi e acaricidi



Impact Gel Scarafaggi

Massima efficacia

Caratteristiche

Di facile impiego: si applica con una siringa/cartuccia in trattamenti localizzati e, grazie alla sua appetibilità ed al suo potere
attrattivo, offre la massima efficacia nel controllo degli scarafaggi.
Il prodotto contiene un amaricante (Denatonio benzoato).

Composizione

Imidacloprid: 2,15%

Dosi e modalità d'uso

- Blattella Germanica (*Blattella germanica*): 1–4 gocce/m²
- Scarafaggio nero (*Blatta orientalis*): 2–6 gocce/m²
- Blatta americana (*Periplaneta americana*): 2–6 gocce/m²
- Supella longitalpa (*Supella longipalpa*): 1–4 gocce/m²

Controllare il punto esca ogni 7–14 giorni e riapplicare il prodotto se l'esca è stata consumata e l'infestazione persiste. Non applicare più di 4 volte per punto esca durante il trattamento. Il trattamento può essere ripetuto dopo 3 mesi dall'infestazione.

Simbologia di pericolo: GHS09 Aut. Biocida: IT/2019/00553/MRP

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 4 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.