Insetticidi e acaricidi



Pesguard® CT 2.6

Insetticida da applicare mediante irrorazione per il controllo dei ditteri

Caratteristiche

Pesguard® CT2.6 è un insetticida per contatto e ingestione efficace contro le mosche adulte. È indicato per l'applicazione mediante irrorazione su fogli di cartone attaccati alle superfici o appesi (fuori dalla portata degli animali) ed è utilizzato per il controllo delle mosche nelle stalle e in altri ambienti di ricovero di animali. Controlla le popolazioni di mosche fino a 30 giorni dopo il trattamento.

Composizione

Clothianidin: 2,3%
Tricosene: 0,04%

PZ/cartone

FLACONE 500 mL × 10 pz

Dosi e modalità d'uso

Distribuire Pesguard® CT2.6 su fogli di cartone non assorbenti di dimensioni massime complessive pari a fino al 10% della superficie dell'ambiente di ricovero degli animali da proteggere (es. 10 m² complessiva dei fogli di cartone per 100 m² di superficie del ricovero da proteggere). Si consigliano fogli di cartone singoli di dimensioni 20 × 15 cm o 10 × 30 cm.
500 ml di Pesguard® CT2.6, per proteggereun'area di 200 m², devono essere distribuiti, previa diluizione in 1litro di acqua, su 30-60 fogli di cartone.
Applicare solo su fogli di cartone non assorbenti da fissare alle pareti o in altre zone in cui le mosche stazionano (ad es. luoghi caldi e soleggiati su tavole,staccionate, pali, telai di finestre o cornici di pareti), iniziando il trattamento nel momento in cui viene osservata la prima presenza di mosche negli ambienti.
Per un risultato ottimale, applicare il prodotto su molte piccole aree, distribuite uniformemente in tutto il locale. Da utilizzare solo in aree inaccessibili al pubblico, agli animali domestici e agli animali non bersaglio. Potrebbe essere necessario un periodo di asciugatura di 5-15 minuti prima dell'applicazione del cartone, a seconda delle condizioni ambientali e operative. L'infestazione da mosche negli ambienti di ricovero di animali può essere stimata con metodi di monitoraggio (ad esempio, il monitoraggio della (ri)comparsa di larve nel letame o della popolazione di mosche adulte con strisce di colla) prima del trattamento chimico.
Applicare al massimo 3 volte all'anno nella stagione di sviluppo delle mosche (primavera e inizio estate). L'intervallo tra due applicazioni deve essere di almeno 30 giorni.
È necessario utilizzare un'irroratrice a spalla o a zaino con un dispositivo a bassa pressione (3 bar o inferiore) azionato manualmente e con un ugello in grado di irrorare gocce grosse. Durante l'irrorazione dirigere il getto verso il basso.
Non preparare una quantità di soluzione superiore a quella necessaria.
Non è possibile conservare il prodotto diluito. Usare la soluzione diluita il giorno stesso della miscelazione. Non applicare il biocida direttamente sulle superfici (ad es. pareti) dell'edificio. Non applicare il biocida direttamente su letame/liquame. Non applicare il prodotto in aree soggette a lavaggio.

Campi d'impiego

Stalle, ambienti di ricovero di animali, aree di deposito di rifiuti. Solo per uso interno.

Simbologia di pericolo: GHS07, GHS08, GHS09 Aut. Biocida: IT/2023/00860/MRP

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 4 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.